

L'ortodòncia

Quan s'hauria de començar un tractament d'ortodòncia?

Aquesta pregunta no té una resposta concreta, ja que l'inici del tractament depèn totalment de la maloclusió (mala posició de les dents o dels ossos) que presenta cada pacient.

Les maloclusions es poden classificar *grosso modo* en dos tipus:

1. Maloclusions esquelètiques
2. Maloclusions dentals

1. Maloclusions esquelètiques. Són les ocasionades per un problema als ossos dels maxil·lars. El tractament s'ha de començar quan l'infant encara està en període de creixement (en alguns casos es començaria a cinc anys i en d'altres, cap als deu o onze). Ens podem trobar amb dos casos:

- 1.1. Un exemple seria el de les figures, en què l'os de la mandíbula està més enrere del que li toca i fa la sensació que les dents de la part de dalt són molt sortides cap enfora.

El tractament seria amb un aparell de posar i treure entre un any i mig i dos anys, aproximadament. Després del tractament, hauríem d'esperar que acabessin de sortir tota la resta de dents definitives.



Abans de començar el tractament



Després d'un any i mig de tractament

- 1.2. Un altre exemple seria el que vulgarment anomenem «bifi». En aquest cas la part de dalt del maxil·lar està cap enrere, i moltes vegades ens trobem davant d'un paladar molt estret. Ens interessa, doncs, estimular el creixement del maxil·lar cap endavant i eixamplar-lo. Aquí hem de començar el tractament quant abans millor, i també hem de tenir en compte que són casos que tenen un pronòstic incert, ja que hi ha un component, normalment hereditari, important. Començaríem el tractament a partir de cinc anys, aproximadament. Un cop acabat el tractament inicial, hem d'esperar que surtin totes les dents definitives i després, si cal, posarem aparells fixos per a acabar d'alinejar les dents.



Abans de començar el tractament



Un cop acabat el tractament inicial

El tractament de les maloclusions esquelètiques, doncs, consisteix a arreglar els ossos quan el pacient encara està en fase creixement. Seria ideal tractar aquestes maloclusions abans que s'acabés el creixement, que en les nenes seria entre els onze i dotze anys, i en els nens, més aviat cap als tretze. El que urgeix més de tractar són els casos de pacients «bifi», que són els que tenen més mal pronòstic (hauríem de començar el tractament quant abans millor, entre els cinc o sis anys, o, si és possible, fins i tot abans). Després hem d'esperar a que acabin de sortir totes les dents definitives i valorar de nou si cal aplicar un altre tractament amb aparatologia fixa.

2. Maloclusions dentals. Són les ocasionades només per un problema de mala col·locació de dents, perquè els ossos són al seu lloc. En aquests casos el tractament seria amb aparatologia fixa (els anomenats *brackets*), i es podria iniciar una vegada hagin sortit totes les dents definitives, que seria aproximadament cap als tretze anys, encara que depèn molt de cada pacient.



Abans de començar el tractament



Un cop acabat el tractament

En pacients adults que presenten un problema de maloclusió esquelètica, com que ja no hi ha un creixement posterior, moltes vegades l'única manera de corregir aquests problemes és amb un tractament combinat d'ortodòncia i cirurgia dels ossos.

SANDRA FIGUERAS I SOLER
ODONTÒLOGA I ORTODENTISTA

foixavert s.l.

Servei Integral de Jardineria

Bi. La Sala s/n
17133 Foixà
Tel. 678 93 38 72

LA PLACETA

— ESPAIS CREATIUS —

RE-NAIXEMENT · DANSA · DANSA DEL VENTRE
PINTURA · JOIERIA · CUINA CREATIVA · IOGA
TAI-TXI · ESCRITURA CREATIVA · MÚSICA · CERÀMICA
ESTAMPACIÓ · TALLER D'IMAGINACIÓ · FOTOGRAFIA

— INFORMACIÓ —

Maria Llúcia Auguer
La Placeta, 4 - Verges - Tel. 972 78 00 83



— GARATGE —

Josep Bellapart, S.L.

C/ Baix Empordà, 49 - Tel. i Fax 972 78 00 56
17142 VERGES (Girona)

CENTRE D'ESTÈTICA

TINN

Hores convingudes

PLAÇA D'ESPANYA, 15, 1r 3a
17257 TORROELLA DE MONTGRÍ
Tel. 972 75 88 54

- Centre d'estètica i salut
- Tractaments facials
- Tractaments corporals
- Depilacions de tot tipus
- Depilació amb «luz pulsada»
- Endermologia LPG corporal i facial
- Altres